

**Доклад за извършен
мониторинг на
Четириточкова мечка
пеперуда – район на участък
„Ада тепе“ на находище
„Хан Крум“**

Октомври 2017



изготвил:

Деян Духалов

I. Въведение

Четириточковата меча пеперуда (Тигров молец на Джърси), *Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria* е вид широко разпространен в Европа, Мала Азия, страни от Близкия Изток (Сирия, Ливан, Йордания), Кавказ. В България точното и разпространение не е изследвано.

Заштита е по силата на Закон за биологичното разнообразие.

Натура 2000 вид включен в Приложение II на Директива 92/43 на ЕИО.

II. Методика – съгласно одобрениите работни инструкции на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД

WI 6-2-5 Мониторинг – четириточкова меча пеперуда и запис съгласно предоставен Полеви формуляр FD 6-2-5.1 за четириточкова меча пеперуда.

III. Резултати

III.1. Мониторирани територии

Избора на места за мониторинг са правени въз основа на наличната информация за предпочтитаните (вероятните) биотопи за вида. Бяха избрани места с преобладаващи тревни местообитания, гори от широколистни видове (дъб и акация), разредени гори от двата вида, смесени гори от широколистни и иглолистни дървета, както и културни местообитания, зеленчукови, овощни градини и насаждения с технически култури.

За мониторинга през 2015 г са подбрани точки извън територията на проекта. Местата където е намиран вида в територията бяха заменени с най-близки възможни точки извън оградата за костенурки. На и около “Ада тепе” има 15 точки. (Приложение 1). Избрани бяха и три референтни зони на отстояние 5-10 километра по права линия от мониторираната територия.

Референтна зона “Долна кула” – точки 20-25

Референтна зона “Багрилци” – точки 40-44

Референтна зона “Девесилица” – точки 30-35

През 2016г. започнахме мониторинга с поставяне на светлинни ловилки в точките, където сме намирали пеперудата на „Ада тепе“. Намерението ни беше след като се появи, да разширим търсенето и във възприетите точки където не сме я установявали. Посетени бяха и референтните зони.

През 2017г. поради развитие на проекта за добив на златосъдържащи руди на ДПМК отпаднаха някои точки за мониторинг. Останаха 5 точки до Ада тепе на които сме установявали вида и преди. Това са Т 07, Т 09, Т 14, Т 15 и Т 19 както и точките в референтните зони.

III.2. Теренна работа - резултати

През 2013 година паралелно с работата по мониторинг на сухоземни костенурки и бурунди са проведени 40 теренни работни дни през месеците май, юни, юли и август за търсене на вида през деня.

Три възрастни екземпляра са установени през светлата част на деня. Всички през месец юли. Два на едно и също място кацнали върху акация (салкъм) на 27.07.2013 (Trap 22 270713) и един до оградата за костенурки на 200 метра от първото място в посока юг, кацнала върху дъб. Находката е от предишния ден (26.07.13). Двете животни са намерени в точката в 20.35 часа, а единичния екземпляр в 12.05 часа.

Капани са поставяни 66 пъти (3 капана за 22 нощи) в резултат са уловени 17 броя от мечата пеперуда. Всички са събрани в тринадесет капана. В 10 капана по един екземпляр, 2 капана по два и 1 капан три екземпляра.

През 2015 година паралелно с работата по мониторинг на сухоземни костенурки и бурунди са проведени 48 теренни работни дни през месеците май, юни, юли, август и септември за търсене на вида през деня.

Един екземпляр е установлен през светлата част на деня. Който е и първия за сезона на Ада тепе. Намерен е на 12.08.2015г. в 14 часа в Т 01, до вратата на оградата за костенурки при подстъпа през с. Победа.

Светлинни ловилки са поставяни 101 пъти (за 26 нощи) (Приложения 1 и 2) в резултат са уловени 11 броя от мечата пеперуда. Всички са събрани в десет капана. В 9 капана по един екземпляр и 1 капан два. Пет екземпляра са от Ада тепе (Т 16, Т 03, Т 14, Т 15 и Т 09). В референтна зона “Багрилци” (06/07.09.15) е установена една Меча пеперуда. В зона “Долна кула” (08/09.08.15) няма улов.

Зона “Девесилица” (11/12.08.15) от 6 капана 5 уловени животни за една нощ. След първата појава на индивид са поставяни 33 ловилки, 21 от които на Ада тепе.

През 2016 година паралелно с работата по мониторинг на сухоземни костенурки и бурунди са проведени 47 теренни работни дни през месеците април, май, юни, юли, август и септември за търсене на вида през деня (гъсеници и пеперуди).

Два екземпляра са установени през светлата част на деня. Които са и единствените за сезона на Ада тепе. Намерени са в обедните часове на 23.07.2016г. и 15.09.2016г. от южната страна на тепето.

Светлинни ловилки са поставяни 88 пъти (за 26 нощи) (Приложения 1 и 2) в резултат са уловени 2 броя от мечата пеперуда. Всички са намерени в референтна зона “Багрилци” (22/17.08.16) в Т40 и Т41 . В зони “Долна кула” и “Девесилица” няма улов. След първата појава на индивид (през деня на 23.07.2016) са поставяни 32 ловилки, 20 от които на Ада тепе.

През 2017 година паралелно с работата по мониторинг на сухоземни костенурки и бурунди са проведени 45 теренни работни дни през месеците април, май, юни, юли, август и септември за търсене на вида през деня (гъсеници и пеперуди).

Един екземпляр е установен през светлата част на деня. Намерен е в 13 часа на 03.08.2017г. в Референтна за костенурки зона „Синап“, на брега на р. Кесибир.

Светлинни ловилки са поставяни 90 пъти (за 20 нощи) (Приложения 1 и 2) в резултат са уловени 16 броя от мечата пеперуда.

Първите два са намерени в референтна зона “Девесилица” (13/31.07.17) в Т33 и Т34 .

В зона “Долна кула” не бяхме намирали целевия вид за целия период на изследването ни (2015-2017г.).За първи път го регистрирахме на 19.08.2017г. - един екземпляр в Т 23.

В зона „Багрилци“ за втора година няма улов.

След първата појава на индивид (на 31.07.2017г. в Зона „Девесилица“) са поставяни 33 ловилки, 25 от които на Ада тепе.

Първият улов на Ада тепе се състоя на 02.08.17г., по един екземпляр в Т 07 и Т 09. Следващата много успешна нощ е 18.08.2017г. когато са установени 9 екземпляра в три капана, в точки Т 19 – 1 екз., Т 07 – 5 екз. и Т 09 – 3 екз.

Таблица 1 Разпределение на улова по периоди				
2013 година				
Месец	юни	юли	август	септември
Брой нощи (общо 22)	6	7	9	-
Брой капани (общо 66)	18	21	27	-
Брой уловени екземпляри (общо 17)	0	5	12	-
2015 година				
Месец	юни	юли	август	септември
Брой нощи (общо 26)	8	7	8	3
Брой капани (общо 101)	24	21	43	13
Брой уловени екземпляри (общо 11)	0	0	7	4
2016 година				
Месец	юни	юли	август	септември
Брой нощи (общо 26)	9	9	7	2
Брой капани (общо 88)	22	33	26	7
Брой уловени екземпляри (общо 0)	0	0	0	0
2017 година				
Месец	юни	юли	август	септември
Брой нощи (общо 20)	4	9	5	2
Брой капани (общо 90)	13	45	24	9
Брой уловени екземпляри (общо 16)	0	2	12	2

IV. Анализ на състоянието на популацията на Четириточковата мечка пеперуда (*Euplagia quadripunctaria*)

Предварителната информация, с която разполагахме през 2013 г. беше само, че вида се среща (установени 3 екземпляра) в района на планираната обогатителна фабрика.

При изследването през предишния период установихме вида само на Ада тепе. Екземпляри бяха установени на практика само в салкъмови гори или в непосредствена близост до тях.

През 2015г. си поставихме задача да установим вида на места различни от Ада тепе но не много отдалечени от него, които да ни служат за референтни зони. Предприехме няколко пътувания в района с тази цел. За нуждите на мониторинга определихме три места (Референтните зони) които са с разнообразна растителност, включително акация. В две от тях ("Багрилци" и "Девесилица") установихме вида. Отчетеното обилие в "Девесилица" е най-голямо. За една нощ (6 капана) се хванаха на практика толкова пеперуди колкото за 5 (21 капанонощи) на Ада тепе.

Хладната пролет е основна причина за бавното развитие на гъсениците на Мечата пеперуда. Възрастните (пеперудите) не случайно започнаха да летят 20 дни по-късно отколкото през 2013г. Степента на пригодност на Ада тепе в сравнение с референтните зони тепърва ще се изследва. За създаване на по-ясна картина е необходимо да се натрупа повече информация. Увеличаването на рефренчните зони или просто търсене на вида и на други места в близост може много да помогне за оценка на въздействието върху вида.

Факта, че няма повторно улавяне на индивид в един и същи капан (Ада тепе) говори за широко разпространение и малка плътност на популацията. От друга страна разстоянието между капаните е сравнително малко за летящ вид, който се привлича от светлина през нощта.

Двата установени през 2016г. индивида на Ада тепе смятаме, че не са местни. И двете животни бяха силно изтощени с множество разкъсвания по крилете, бледи цветове и нестабилен полет. За разлика от тях индивидите от зона „Багрлци“ бяха „свежи“. Фактите говорят, че през тази година е нямало или са били много малко, метаморфизиралите Мечи пеперуди в района на Ада тепе. Каква е причината за това е трудно да се каже. Лятото беше горещо и сухо. Нощите по-скоро прохладни. Характеристики свързвани с континенталния климат. Средиземноморското влияние изглеждаше по-слабо. В контекста на глобалното затопляне това са очаквани процеси макар, че от толкова кратки наблюдения е несигурно да се правят генерални заключения.

През 2017г. вида се „завърна“ на Ада тепе. За разлика от 2015г. когато установихме широко разпространение и малка плътност на популацията сега

появата и е с по-неравномерен характер. Наблюдавахме няколко нощи с пик в числеността, между тях пълно отсъствие. Такава појава е по-характерна за пристигащи и преминаващи индивиди. Може да се твърди, че поради слабата предишна година регистрираните през 2017г. не са местни.

V. Заключения

- Числеността на вида в района е със значителни флуктуации през отделните години.
- Необходимо е натрупване на по-обилна информация за състоянието на популацията на Четириточковата мечка пеперуда в Крумовградския регион.
- Не се открива съществено въздействие върху вида в най-близката периферия около зоната на минния обект на ДПМК.

